## III. Contrile et traitement du luit

Les deux contibles suivants doivent être granqués quotidiennement :

RESOLUTION (70) 10

« contrôle de l'acidité sur chaque schantillos de lait : tout lait ayant une acidité . so (Adopted by the Ministers Deputies on 7 March 1970) E. L. & Statistic que

e épreure de l'illemination par les reyons olire-violets sur chaque biberon ; ceres éprenve qui a pour hat de détectet la présence de laits animans peut être contrôlée par une Argenve d'aggineraction ou de précipitation,

SUTATS SVITATUROS POUR chaque lonneuse, il devrair dur procéde deux fois par semaine à une épecuve densimérique, à un dosage butyrans et à un dosage de l'extrait sec du lanfound. Un caux d'axerait sec inférieux à 8 grammes pur litte doit faire considérer le latte genera suspect de mouillaga,

The Committee of Ministers,

Ces différents contôles, qui ne soustraient pas plus de 5 % des quantités de lair Having regard to the provisions concerning the granting of consultative status to international non-governmental organisations, is substructed at substruction of

Having regard to the supporting documents submitted by the organisations

mentioned in that recommendation,

IV. Conservation do lait

- Les délais maximaux de conservation du lait humain sont de trois semaines sons
  - 2. International Hotel Association us my ro blogged rech'l & sion vis estable reches
  - 3. International Association of Schools of Social Work;

of to an A. International Council of Social Democratic Women of Auditraid vist and Parilles coliformes ou indologenes décelables dans l'millitre.

Le nombre de germes banaux ne doir pas dépasser 1 000 par milliliere.